

Procédure Normalisée de Fonctionnement

TITRE : UTILISATION D'UNE CRÈME DÉPILATOIRE CHEZ LES RONGEURS	NUMÉRO : T-30
DESTINATAIRES : Personnel du Service des animaleries et usagers	Version 1 : 26.04.2019 Version 2 : 25.11.2019
ÉMISE PAR : Natacha Duquette et Normand Lapierre, T.S.A. CORRIGÉE : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	CIPA : 20.01.2020
APPROUVÉE PAR : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	DATE : 30.04.2019
BUT : Décrire procédure lors de l'utilisation d'une crème dépilatoire chez les rongeurs.	

MATÉRIEL :

- Isoflurane, chambre d'induction, masque
- Appareil à anesthésie
- Gazes de coton stérile
- Onguent ophtalmique lubrifiant
- Coton-tiges stériles
- Ciseaux à iris ou rasoir électrique
- Bécher rempli d'eau tiède stérile
- Crème dépilatoire

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Le port de gants, d'un sarrau ou d'un habit de travail de type chirurgical et d'un masque N95 est obligatoire, afin de réduire l'exposition du manipulateur aux protéines urinaires des rongeurs qui sont hautement volatiles et allergènes.

L'effet foetotoxique de l'isoflurane n'a pas été prouvé. Les femmes enceintes devraient consulter leur médecin avant de travailler avec cet anesthésique. La chambre d'induction et l'appareil à anesthésie doivent toujours être reliés à un système d'évacuation des gaz ou de filtration des gaz. Se référer aux F.D.S. respectives situées dans le SB-M415 ou le CB-R325 pour plus de détails concernant ces gaz.

PROCÉDURES :

1. Anesthésier la souris dans la boîte d'induction avec l'Isoflurane (3-5%) et O₂ (1L/min).
2. Lorsque la souris est endormie, baisser la concentration d'Isoflurane à 1,5-2% (sans changer le débit d'O₂).
3. Mettre l'animal au masque afin de maintenir l'anesthésie.
4. Appliquer un onguent ophtalmique lubrifiant sur les yeux de l'animal.
5. Raser ou couper les poils de la ou des régions nécessitant une épilation.
6. Étendre la crème dépilatoire sur les régions visées avec un coton-tige.
7. Laisser agir un maximum de 2 minutes.
8. Essuyer la crème avec des compresses sèches.

9. Rincer minimalement 3 fois les régions traitées avec la crème, à l'aide de compresses mouillées d'eau tiède stérile.
Utiliser une nouvelle compresse entre chaque passage.
10. Procéder à l'étape chirurgicale.